

กระบวนการเฝ้าระวังการเกิด Metformin Associated Lactic Acidosis : MALA

ผลลัพธ์	เป้าหมาย	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ไตรมาสที่ 2)
ไม่มีข้อห้ามใช้ (ตัวชี้วัด RDU)	≥ 80 %	95.71	95.36	93.93
eGFR <30	ลดลง	-	35 ราย	0 ราย
eGFR 30-44 ได้รับยา Metformin เกินขนาดที่แนะนำ (1000 mg/day)	ลดลง	-	41 ราย	0 ราย

กระบวนการ ในการพัฒนา โดยการจัดทำฉลากยามาตรฐาน

การจัดทำฉลากยามาตรฐาน

- ▶ พัฒนาฉลากและฉลากยาเสริม อย่างน้อย 13 กลุ่มยา (ครอบคลุมทั้งรพ.สต.)
- ▶ เพิ่มขนาดฉลากยาจาก 8x5 เป็น 9x6 cm
- ▶ ระบุข้อความในฉลากยา
 - ชื่อสามัญทางยาและชื่อยาภาษาไทย
 - ขนาดยา/ความแรง
 - วิธีใช้ยา
 - ข้อบ่งใช้
 - ข้อควรระวังหรือคำเตือน
 - ระบุข้อความยาที่ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ ยากลุ่ม Statin, Warfarin*, Ergots
 - เน้นข้อความที่สื่อสารให้ผู้ป่วย เพื่อผู้ป่วยเข้าใจและรับประทานยาได้ถูกต้อง

